

## Laserski uređaji u sistemima tehničke zaštite

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Fakultet za pravne i poslovne studije

- 1.Uvod
2. Princip rada
- 3.Primena lasera
- 4.Primena laserskih uredjaja u sistemima zastite

### UVOD

Laser (prema eng. Light Amplification bi Stimulated Emission of Radiation) naziv je za optičku spravu koja emitiše koherentni snop fotona.

Istraživanja koja su prethodila nastanku lasera proizlaze iz grane fizike poznate pod imenom kvantna mehanika. 1900. godine Maks Plank je postavio hipotezu da pobuđeni atom zrači energiju u diskretnim paketima, koje je nazvao kvantima, a ne kontinuirano kao što je to objašnjavala tada raširena teorija elektromagnetskog zračenja. Planck nije nikada nastavio rad na problemima koji su proizšli iz njegove teorije. Međutim, 5 godina kasnije je napravio Albert Ajnštajn, iznoseći ideju o svetlosti koja se ne sastoji od talasa nego od energijskih paketa (kasnije nazvanih fotoni); što je veća frekvencija svetlosti fotoni imaju više energije. On je opisao kako elektroni, pod nekim određenim uslovima mogu apsorbovati i emitovati fotone. Ovaj naučni prodor koji će mu kasnije doneti zasluženu Nobelovu nagradu, upotrebio je za objašnjenje fotoelektričnog efekta (izbor elektrona iz materijala zbog upada svetlosnog zračenja na materijal, prvenstveno vidljive svetlosti). S Ajnštajnovom teorijom svetlosti kao čestice nisu se baš svi slagali; rasprave na tu temu nastavile su se sledećih nekoliko decenija. Ali, čak pre nego su fizičari prihvatali ideju da je svetlost istovremeno i talas i čestica, Einstein je otkrio još jednu novu pojavu. Prema modelu atoma kojega je prikazao Nils Bor u nizu članaka iz 1913. godine, elektron koji se giba oko Jezgra ima određenu putanju (orbitalu) koja zavisi o energiji elektrona. Elektron može da apsorbuje samo onu količinu energije koja mu je potrebna da iz jedne određene orbitale skoči u drugu orbitalu sa većom energijom. Elektron emituje određenu količinu energije pri prelasku iz orbitale s većom energijom u orbitalu s nižom energijom. Ovaj model objašnjava poznate spekture gasova, npr. neon-a i karakteristične boje pri gorenju izbojnih lampi, kao što su lampe bazirane npr. na živi ili natri.

Atomi koji se nalaze u pobuđenom stanju - što znači da njihovi elektroni naseljavaju orbitale viših energija - će se verovatno, spontanim putem spustiti u orbitale niže energije ili osnovno stanje, disipirajući pri tome energiju akumuliranu u atomu. U danom atomskom sistemu, spontana emisija nastaje nasumično, pa su i smerovi širenja emitovanih fotona nasumični. Einstein je uočio da, ako se atomi u pobuđenom stanju sudare s fotonom prave energije (energije jednake razlici između energija višeg i nižeg stanja u atomu), taj sudar može izazvati određeni oblik emisione lančane reakcije, pri čemu dolazi do povećanja intenziteta svetlosti koja prolazi kroz sistem atoma-elektroni u želji da apsorbuju dolazeći foton emituju onaj foton koji su već prethodno bili apsorbirali. Pri tome, emitovani fotoni imaju isti smer kao i apsorbovani fotoni. Taј proces se naziva stimulisana emisija. Trik je u tome što će pojačanje stimulisanim emisijom nastati samo onda kada u ukupnoj populaciji nekog atomskog sistema ima više atoma u pobuđenom stanju, nego atoma u stanju niže energije. Ovakva situacija je potpuno suprotna normalnoj raspodeli naseljenosti u atomskom sistemu. Stimulisana emisija zahteva nešto što se zove inverzija naseljenosti; svi atomi se moraju veštačkim putem dovede u pobuđeno stanje

što se obično postiže izlaganjem svetlosti.

...

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE  
PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)