

Bolesti na tutunot (makedonski)

Vrsta: Seminarski ð Broj strana: 24 ð Nivo: Zemjodelski fakultet, Skopje

Plamenica na tutunot

(Peronospora tabacina Adam)

Plamenicata na tutunot pretstavuva edna od najceštite i najopasnite gabni bolesti na tutunskata kultura kaj nas i vo svetot. Kako što e poznato, parazitot na ovaa bolest vo Evropa e otkrien 1958 godina na tutunskite rastenija što trebalo da služat za ispituvawe na rastitelni virusi vo oranžeriите na naučnite ustanovi vo Rothamsted, Anglija i vo Wageningen, Holandija. Poradi nevnimanie vo raboteweto, ovoj parazit bil prenesen na rasadenite tutunski rastenija na nivoa vo Holandija, ottamu se rasprostranil vo mnogu zemji vo Evropa , Afrika i Azija.

Avstralija se smeta za tatkovina na parazitnata gaba P.tabacina. Vo severniot del na ovoj kontinent, ušte vo 1891 godina bila zabeležana na kulturnite i divite vidovi tutuni. Za kuso vreme bolest se prošrla i zafatila moše širok areal, nanesuvajќи му ogromni šteti na tutunoproizvodstvoto, osobeno vo 1934 godina.

Rastenija domaćini - Od golem broj opiti vo Evropa, Avstralija i SAD, e potvrdeno deka gabata P.tabacina e tesno specijaliziran parazit. Najčesto rastenijata domaćini se od rodot Nicotiana, a može da parazitira i nekoi vidovi od familijata Solanaceae.

Simptomi – Parazitot P.tabacina najčeesto gi zarazuva listovite na tutunskoto rastenie, na koi pričinuva najkarakteristični simptomi. Ovoj parazit može da se pojavi i na korenot, stebлото, cvetot i semenskите čauri. Negovoto prisustvo može da bide zabeležano vo site fazi od niknuvaweto na semeto, so završuvaweto na berbata na listovite. Ako zarazata nastapi vednaš po niknuvaweto na rasadot vo leite, rastenijata dobivaат žoltenikava boja, zaostanuваат vo rastot i vo povlažni uslovi potpolno uginuваат. Kaj podocnite zarazi vo leite, prvite znaci se manifestiraат со појава на žoltenikavi damki na listovite. Tie poslabo ili posilno se zavitkuваат надолу и на нивната опаčина се појавува karakteristična bela muvliva pokrivka, sostavena од micelijata и органите за razmnožuvawe на parazitot. Овaa, во почетокот е poretna, а подоцна се zgusnuva. Во повлаžни uslovi, процесот на образувавето на покривката е забрзан, таа е sinkavo oboena, и поради тоа болеста во Америка и Авstralija добила име “Blue mold”, што значи сина muvla. Со stareeweto на vlaknata stantuva crvenkasta, a ponekogaš se zabeležuva i na gornata strana na listot. Najčeesto таа е prisutna na izvitkanite kraиšta na listot, a mnogu retko i na lisnite drški. Во леата обolenите listovi se raspoznavaat tokmu po tipičnoto zavitkuvawe kon опаčината на listot. -----

OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com